

pumilene®

Tosse

TRIPLICE AZIONE

- 1 PROTEGGE LA MUCOSA**
- 2 CALMA LA TOSSE SECCA E PRODUTTIVA**
- 3 FAVORISCE LA RIMOZIONE DEL MUCO**

1. Identificazione, composizione e finalità d'uso del dispositivo medico

Pumilene Tosse TRIPLICE AZIONE è un dispositivo medico che, grazie ad una esclusiva associazione di polisaccaridi contenuta negli estratti vegetali e nel complesso MUCOBARRYL®, è in grado di calmare la tosse, alleviare il bruciore e favorire l'eliminazione delle secrezioni in eccesso.

Pumilene Tosse TRIPLICE AZIONE calma la tosse secca e produttiva, inoltre è un utile coadiuvante per la protezione delle vie respiratorie in quanto, creando una barriera mucoadesiva, limita il contatto con gli agenti irritanti ed i microrganismi patogeni.

1.1 Meccanismo d'azione

Il mal di gola, la tosse ed altre affezioni acute a carico del tratto faringeo e tracheobronchiale sono patologie molto comuni, spesso causate da agenti patogeni o dall'esposizione a stimoli nocivi irritanti tra cui gli inquinanti ambientali e le temperature rigide.

Pumilene Tosse TRIPLICE AZIONE è formulato con estratti vegetali utili per proteggere la mucosa, calmare la tosse e ad azione pro-espettorante.

I polisaccaridi di origine vegetale contenuti negli estratti vegetali e nel complesso MUCOBARRYL®, grazie alla loro mucoadesività, creano un film protettivo che impedisce ai microrganismi patogeni di aderire alle mucose del tratto respiratorio e le protegge dagli stimoli nocivi ambientali.

Grazie alla loro affinità per l'acqua i polisaccaridi favoriscono l'idratazione delle mucose e fluidificano il muco.

Inoltre, l'azione lenitiva degli estratti calma la tosse secca e produttiva.

Il miele contenuto in **Pumilene Tosse TRIPLICE AZIONE** conferisce al prodotto un gradevole sapore.

1.2 Componenti

MUCOBARRYL® complex, Piantagine estratto secco, Grindelia estratto secco, Timo bianco o.e., acqua, succo di mela, fruttosio, miele. - Senza glutine e lattosio

2. Confezione

Flaconi di vetro da 158 ml (210 g)

3. Dosaggio e modalità d'uso

Bambini tra 3 e 6 anni: 5 ml fino a 2 volte al giorno

Bambini da 6 a 12 anni: 5 ml fino a 4 volte al giorno

Adulti e bambini dai 12 anni: 10 ml 2-4 volte al giorno.

Agitare bene prima dell'uso. Chiudere saldamente dopo l'uso. Risciacquare il misurino dopo l'uso.

Per i bambini al di sotto dei 12 anni si consiglia di assumere il prodotto sotto controllo medico.

4. Effetti collaterali

Alle dosi necessarie per ottenere un effetto terapeutico, non è mai stata riportata la comparsa di effetti collaterali. L'unica eccezione può essere, in rari casi, gonfiore transitorio di lieve entità a causa della fermentazione intestinale dei polisaccaridi.

Non usare in caso di allergia / ipersensibilità individuale ai componenti di **Pumilene Tosse TRIPLICE AZIONE**.

Non usare in caso di allergia nota per le api.

5. Interazioni con integratori alimentari e farmaci

Per i componenti di **Pumilene Tosse TRIPLICE AZIONE**, alle dosi consigliate, l'unica interazione conosciuta è la modifica da parte degli arabinogalattani del larice della farmacocinetica dell'ibuprofene. In ogni caso, è consigliabile distanziare l'assunzione di **Pumilene Tosse TRIPLICE AZIONE** almeno 2 ore da quella di farmaci o integratori alimentari.

Consultare il medico in caso di terapie farmacologiche in atto.

6. Conservazione

Conservare a temperatura ambiente controllata tra i 15°C e i 25 °C, lontano da fonti di calore, luce ed umidità.

Assicurarsi di chiudere saldamente il contenitore dopo l'uso.

7. Avvertenze e precauzioni

Non assumere sotto i 3 anni.

Nei bambini di età compresa tra 3 e 6 anni utilizzare il prodotto solo sotto consiglio e stretta supervisione del medico.

Non utilizzare in caso di ostruzioni esofagee.

In caso di ernia iatale, consultare il medico prima di assumere il prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non assumere in caso di intolleranza al prodotto.

In gravidanza e allattamento si consiglia di assumere il prodotto solo dopo consiglio medico.

Non assumere in caso di ipersensibilità nota ai componenti: contiene miele, Piantaggine estratto secco, Grindelia estratto secco, Timo bianco o.e., lichene islandico e arabinogalattani da larice.

Tosse e mal di gola possono essere sintomo di un'infezione: se i sintomi persistono per più di 7 giorni di trattamento o se è presente febbre consultare un medico. In ogni caso non assumere il prodotto per più di 15 giorni, salvo diversa indicazione medica.

Non superare la dose consigliata.

Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.

8. Data di scadenza

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Usare entro 2 mesi dall'apertura.

9. Smaltimento

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale.

Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Ultima revisione: 04/2024

 SIIT srl Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITALY

Distributore: MONTEFARMACO OTC SpA
Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)



 0426
DISPOSITIVO MEDICO



 **MONTEFARMACO**