

normalene[®]

Macroglol 4000

20 bustine monodose da 10 g
soluzione orale

Senza zucchero
Adatto ai diabetici
Senza glutine
Senza lattosio

AGISCE ENTRO 24-72 ORE

COMPOSIZIONE

Macroglol, sucralosio, aroma arancia.

CONFEZIONI

Normalene Macroglol 4000 è disponibile nelle seguenti confezioni:

- 20 bustine monodose da 10 grammi

COME AGISCE

Il macroglol è un polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione trattenendola nelle feci. Determina una reidratazione e un ammorbidimento della massa fecale e ne facilita l'evacuazione. Accelera il transito intestinale favorendo la peristalsi. Non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastro-intestinale e non porta a squilibri idro-elettrolitici, se assunto con la dose indicata di liquido.

INDICAZIONI

Trattamento sintomatico della stipsi. Favorisce la peristalsi, aiutando ad avere un'adeguata evacuazione intestinale, contrastando così la stitichezza e prevenendo la formazione di fecalomi.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE E POSOLOGIA

Normalene Macroglol 4000 - 10 g

Indicato per adulti e bambini di età superiore ai 12 anni

- da 1 a 4 bustine al giorno

La dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire un'evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente le 4 bustine al giorno. Sciogliere la polvere in acqua o altro liquido (125 ml per ogni bustina) e assumere immediatamente. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (1 bustina al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera.

Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico.

AVVERTENZE

La somministrazione nei bambini deve essere effettuata sotto diretto controllo di un adulto.

Consultare il medico prima dell'uso in gravidanza e allattamento.

Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.

Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale.

Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che

devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore.

Il prodotto può comportare un potenziale effetto di interazione quando utilizzato con addensanti alimentari a base di amido. Il macroglol contrasta l'effetto addensante dell'amido, liquefacendo i preparati che dovrebbero invece restare densi per consentire l'assunzione da parte di persone con problemi di deglutizione.

In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.

CONTROINDICAZIONI

Non assumere Normalene Macroglol 4000 in caso di:

- Ipersensibilità nota verso uno o più componenti.

- Ileo paralitico

- Perforazione, ostruzione o stenosi intestinale

- Gravi malattie infiammatorie dell'intestino

(es. colite ulcerosa, malattia di Crohn, megacolon tossico)

L'uso dei lassativi è controindicato nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione.

EFFETTI INDESIDERATI

Potrebbero verificarsi alcuni disturbi gastro-intestinali (mal di pancia, flatulenza, gonfiore addominale, nausea e incontinenza fecale). La diarrea è un effetto secondario all'assunzione di dosi eccessive di Normalene Macroglol 4000 - ed è evitabile diminuendo la dose di assunzione.

Sono stati riportati raramente casi di reazioni da ipersensibilità (rash cutaneo) a seguito dell'utilizzo di prodotti contenenti macroglol. Nel caso, sospendere il trattamento e consultare il medico.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato.

Data ultima revisione: Giugno 2023

DISPOSITIVO MEDICO



Biofarma
Via Castelliere 2
Mereto di Tomba (UD)

Distributore:
Montefarmaco OTC SpA
Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI)

 **MONTEFARMACO**

052601230601
(IFU)_06/23r_0_06/23)